

20 li
ORDINIS MEDICI

IN

VNIVERSITATE LITTERARIA IENENSI

H. T.

DECANVS

D. CHRIST. GODOFRED. GRVNER

SEREN. DVC. SAXO-VINARIENS. ET ISENACENS. CONS.
AVL. BOT. ET. THEORET. PROF. PVBL. ORD. VAR. ACA-
DEM. ET SOCIET. SODALIS

SOLLEMNIA INAVGVRALIA

VIRI

PRAENOBILISSIMI ATQVE EXPERIENTISSIMI

FREDERICI HOFFMANN

ALTENBURGENSIS

A. D. XVIII. AVGVST. cdlccclxxx.


INDICIT

CONTINVATVR

ANONYMI FRAGMENTVM
DE VENAESECTIONE

I E N A E

LITTERIS FICKELSCHERRII.





Επὶ ἑν α). τῶν προφάτων β)
 φλεγμανόντων μορίων γ) ἐκ τῶν
 ἀντικειμένων δὲ ποιῶσθαι τὴν κέ-
 νωσιν, ἐπὶ δὲ τῶν χρονιωτέρων,
 ἐκ τῶν πλησίον. πολλαχῶς μὲν
 γὰρ τῷ σώματος φλεβοτομῶμεν
 ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ δ) ἀγκῶνος ἐνδο-
 θεν, ἀλλὰ προσεκτέον, ὅτι τῇ μὲν
 ἐνδον ε) καὶ μαχαλιάϊα f) φλεβί
 καθόλου μὲν ἡ ἀρτηρία πρόκειται
 g), τῇ δὲ μέσῃ νεῦρον. ἡ δ' ἄνω,
 ἡ καὶ ὠμιαία h) προσαγορευομέ-
 νη, παντελῶς ἔμφορος i). καὶ
 ἐπὶ μὲν τῶν περὶ τὴν κεφαλὴν
 παθημάτων k) τὴν ὠμιαίαν τέμ-
 νομεν, ἐπὶ δὲ τῶν κατὰ l) τῷ

In recens inflammatis mem-
 bris ex oppositis locis sangui-
 nem mittere oportet, in diutur-
 nis inflammationibus, ex vici-
 nis. In multis quidem corpo-
 ris locis secamus venas, ple-
 rumque tamen in interiori cu-
 biti flexura. Sed attendendum
 est, quoniam interiori et alari
 venae vndique arteria subia-
 cet, mediae vero nervus; su-
 perior vero, quae et hume-
 ralis appellatur, prorsus fu-
 gienda est. Etenim in capi-
 tis affectionibus humeralem
 infecamus, at in morbis colli
 ala-

τρα. A 2

α) PAVLL. αἱ εἰ.

β) PAVLL. προφάτων.

γ) Cod. Mosq. leg. tantum ἐκ τῶν πλησίον. Sed haec sensum non habent.
 Ergo ex PAVLLO reposui, quae deerant. δ) PAVLL. add. δι τῷ.

ε) PAVLL. ἴσιν.

ζ) PAVLL. add. καλυμμένη.

g) PAVLL. ὑποκειται. Recte et conuenienter anatomiae.

h) PAVLL. ἡ δὲ ἄνω καὶ ὠμιαία.

i) PAVLL. ἀφροσ.

k) PAVLL. ισσημάτων.

l) PAVLL. κάτω.



τραχήλῃ, τὴν μαχαλιαῖαν m). ἐπαμφοτερίζει δὲ ἡ μέση· δεῖ ἐν
τενιδίῳ n) σενῶ διαδῆσά τινι ο)
περὶ τὰς μύας τῷ βραχίονος μέ-
ρους p), καὶ τῇ πρὸς ἀλλήλας τῶν
χειρῶν τρίψει πληρωθεῖσαν τὴν
φλέβα τὴν ἐπιτηδείαν τῇ χρεῖα
διελεῖν ἐπικαρσίως q) καὶ
ὅλον αὐτῆς τὸ πλάτος μόνον. καὶ
γὰρ αἱ μείζους τέττε δυσαπῆλω-
τοι r) τῶν διαιρέσεων s), καὶ αἱ
σενῶ λίαν φλεγμονώδεις t) πρὸς
τὸ u) τὴν τῷ παχυτέρῳ χυμῷ
κωλύσειν διέξοδον. ἐφ' ὧν δὲ v)
κατὰ τὴν δευτέραν ἡμέραν καὶ w)
τρίτην, ἐνίοτε δὲ καὶ κατὰ τὴν
τετάρτην, ἐπαφελεῖν ἐλπίζομεν x),
λοξοτέρως y) δεῖ τὴν φλέβα διαι-
ρεῖν, ἵνα μὴ ἐν τῇ κάμψει τῆς χει-
ρὸς σσηρεῖα z) ταχέως ἀπῆ-
λωθῇ. ἔτω δὲ ἔδοξεν Ἀντύλλῳ
καὶ Κρατύλλῳ τοῖς σοφοῖς b).

alarem; vtrique media conue-
nit. Oportet igitur fascia an-
gusta circumligare musculo-
sam brachii partem, et frictio-
ne manuum mutua repletam
venam, quae apta videbitur,
transuersim discindere secun-
dum totam ipsius latitudinem.
Etenim maiores incisiones ae-
gre cicatricem ducunt, et per-
angustae magnam inferunt in-
flammationem, quoniam cras-
sioris humoris transitum pro-
hibent. In quibus vero vel
post secundum et tertium diem,
interdum post quartum, sangui-
nem detrahere volumus, in
his obliquius vena aperienda
est, ne in manus flexione hi-
ans, breui ad cicatricem per-
ueniat. Sic visum est ANTYL-
LO et CRATYLO, viris sapien-
tibus.

m) Sic. script. pro vitioso, *μυσχαριῶσαν*.

n) PAVLL. *ταυιδίῳ*.

o) PAVLL. *τι*.

p) Cod. *περὶ τὰς μύας τῷ βραχ. μέρος*. PAVLL. *περὶ τὰς μύας κ. λ.* Equi-
dem legerem *περὶ τὸ μυῶδες τῷ βραχ. μέρος*.

q) Cod. Mosq. *ἐπὶ καρδίας καὶ δόλου*, sine sensu. PAVLL. *ἐπικαρσίως, καὶ*
εἰλον. Recte.

r) Repos. *δυσαπῆλωτοι* pro *δυσαφ*. etfi c. cod. consentit. PAVLL.

s) PAVLL. non habet *ταῖς διαιρ.*

t) Leg. *φλεγμονώδεις* pro *φλεγμονώδες*, vt paullo infra *ἀπῆλωθῃ*.

u) Cod. leg. *πρὸς τὸ μὲν*, sed contra sensum. Deleui ergo *μὲν*.

v) PAVLL. *δὲ καὶ*.

w) PAVLL. add. *τὴν*.

x) Cod. *ἐλπίζομεν*.

y) Cod. *ἰξοτέρως*. Sed aptior est PAVLL. *λοξοτέρως*.

z) Sic ex PAVLL. reddidi. Cod. male, *σσηρεῖσθαι ὤ*.

a) PAVLL. *γάρ*.

b) ANTILLVS quidem, ceu praestantissimus medicus, physicus et
philo-

τὸ δὲ ποσὸν τῷ κεννόμενῳ τῇ τε
 ραίῳ τῆς δυνάμεως, καὶ τῷ μέ-
 γεθει·) μετρεῖσθω τῷ νοσήματος.
 πλῆθος ὅν ὑποκειμένη χυμῶ καὶ
 ζέσεως ὕλης πρὸς ἀπαξ μέχρι δ)
 λειποθυμίας κεννόμεν, ἐρρωμένης
 δηλονότι τῆς δυνάμεως, λειποθυ-
 μῆτος τῷ κάμνοντος ε) διὰ τὸ
 τὸν χυμὸν ἐν τῷ στομάχῳ παραρ-
 ρύηται· διὸ καὶ πρὸ τῆς αὐταρ-
 κῆς f) κενώσεως πολλοὶ κατ' ἀρ-
 χὰς εὐθὺς λειποθυμῶσιν, ἀλλὰ
 δεῖ τῷ λόγῳ τῆς κενώσεως γε-
 νέσθαι τῶν τοις γ) τὴν λειποθυμίαν.
 εἰ δὲ πολλῆς μὲν χρεῖα κενώσεως,
 ἢ δὲ θύναμιν ἀδενῆς τυγχάνη,
 ταμινεύεσθαι δεῖ τὴν κένωσιν, καὶ
 τὴν πρώτην ἀφαίρεσιν ἐλλειπετέ-
 ραν ποιησάμενον ἀφαιρῆν h) αὐ-
 θις, εἰ δεῦσοι, καὶ δευτέρα, καὶ
 τρίτη i). κεννόμεν δὲ ὅλον εἰ μό-
 νον ἐν πληθωρικῇ διαθέσει γεγόμε-
 νον, ὡς φησὶ καὶ ὁ σοφὸς Γαλη-
 νός, A 3

tibus. Quantitatem vero mit-
 tendi sanguinis virium robore
 et morbi magnitudine aestima-
 re fas est. Copiam igitur in-
 tus haerentis humoris et fer-
 uentis materiae semel usque
 ad animi deliquium euacua-
 mus, validis nimirum viribus,
 aegrotο non animo linqui coe-
 pto, propterea, quod humor
 in ventriculum non confluit.
 Haec fere causa subest, quare
 multi ante idoneam euacuatio-
 nem initio statim delinquunt
 animo, sed ratione eua-
 cuationis, his fieri oportet li-
 pothymiam. Si vero multa
 opus sit vacuatione, et vires
 fuerint infirmae, partiri san-
 guinis missionem necesse est,
 et prima paulo parcius sit, de-
 inde, si opus fuerit, secunda
 et tertia. Euacuamus vero to-
 tum

philosophus, satis notus est ex ORIBASIO, AETIO, PAVLLO, STO-
 BAEΟ, et aliis. Sed quis hominum aut forte deorum, alter hic
 sit CROTULLVS, minus profecto liquet. Forfan igitur scribendum
 hic fuerit Κροτύλλου. CRATYLVS vero notum satis est magni quon-
 dam philosophi nomen ex ipso PLATONE, DIOGENE, LAERTIO
 cet. Sed in re incerta nihil certi hic definitio, quin potius omnia
 aequo et perspicaci lectorum acutiorum iudicio placide permitto.

TRILL. Ap. PAVLL. iste prorsum deest c. additamento honorifico.

c) Vide hac de re GAL. l. cit. c. 9. p. 437. seq. PAVLL. leg. τῷ με-
 γέθει, quod pro cod. τὸ μέγεθος, quia sensum non habet, restitui.

d) PAVLL. ἄχρη. e) PAVLL. εἰ δὲ. Recte. Recepi ergo negatiuam.

f) Cod. αὐτάρκῃ. g) Cod. τέτῃ. Ex PAVLLO, τέτῃς, reddidi.

h) Cod. ἀφαίρειν, sed hoc absonum est. PAVLL. ἀφαιρῆν.

i) PAVLL. tantum leg. καὶ γ'.



νός κ), ἀλλὰ καὶ διὰ μέγεθος
τῆ παύσης, ἐν συμμετρίας χυμῶν
καθεστηκότος. τῆ παντός σώμα-
τος, ὥσπερ ἐπὶ τῆς ἐκ ῥινῶν ἢ
ἀλλοθεν αἰμορραγίας, ὅτι μὴ
πλήθος εἴη ῥεῦσαν, καὶ κενόμεν
ἀντισπαστικῶς ἐκ τῶν ἀντικειμέ-
νων. ὃ μὲν καὶ ἐπὶ ι) τῶν ἰχυ-
ρῶς φλεγμαινόντων κ), καθά-
περ ἐπὶ κωλικῶν τε, νεφρικῶν,
λιθιῶντων η), ὀφθαλμιῶντων ο),
καὶ τῶν ὅπως ὁξέως κατεπειγόν-
των. ἢ γὰρ ὁδύνη καὶ θερμασία
τῆ φλεγμαίνοντος μέρος ρ) αἰ-
τίαι ρεύματος γίνονται, καὶ ἀ-
πέριττον ἢ τὸ ς) σῶμα. χρὴ τοί-
νυν ἐνδεέστερον αὐτὸ ποιεῖν καὶ ς)
τηνικαῦτα ποιῶντα ς) κένωσιν,
ἥτις ἀρμόττειν τ) φαίνεται υ)
καὶ μάλιστα τῇ τε ἡλικίᾳ καὶ τῇ
φύσει τῆ κάμνοντος, ἐπισκο-
πῶντες υ) καὶ τὴν ὥραν ω), καὶ
τὴν

tum non solum in plethorica
dispositione constitutum cor-
pus, vt inquit sapiens GALE-
NVS, sed et propter magni-
tudinem morbi, cum humo-
rum proportio spectanda sit
in quocunque corpore, sicuti
in haemorrhagia narium aut
quacunque alia, quia non ad-
est sanguinis copia, quae
profluit, et per deriuationem
ex oppositis mittimus. Immo
etiam in vehementibus inflam-
mationibus, vt in colicis, ne-
phriticis, calculosis, oculo ae-
gris, et aliis vehementer vr-
gentibus. Dolor enim et calor
inflammatae partis fiunt flu-
xionis causae, etiam si totum
corpus nihil habeat superua-
cui. Eo igitur magis curan-
dum est, vt egestio parciore sit,
et

κ) Videtur huc spectare locus c. 9. ad fin. vbi leg. ἡ πληθυσμὸς καλὴ
μὴ συνδρομή. ι) PAVLL. ἀπὸ κατὰ.

κκ) Repos. φλεγμαινόντων pro φλεγμοσιν.

η) PAVLL. καὶ νεφρῶν λιθιῶν. Ferri tamen vulg. lect. potest, rescriben-
do νεφρικῶν. ο) PAVLL. ὀφθαλμιῶντες.

ρ) PAVLL. μέρος.

ς) PAVLL. add. σύμπερ.

ς) Deest ap. PAVLL. καὶ.

τ) PAVLL. κοινῶς.

υ) Est in cod. γὰρ μόνον, sed sensus ἀρμόττειν requirit, et PAVLL.
confirmat.

ω) PAVLL. φαίνεται καλ.

ω) PAVLL. ἐπισκοπῶντα.

ω) Prudentissima haec et saluberrima sententia transumpta est ex ipso
HIPPOCRATE, Aph. 2. Sect. I. et Lib. I. De DIAETA. Saepius enim
istam repetit HIPPOCRATES, et inprimis GALENVS, quem vid.
potissimum in Comment. IV. in Lib. Hippocr. de Alimento, p. 392.

Tom.

τὴν χῶραν, καὶ τὰ ἔτη τῶ νοσῶν-
τος· ἐφ' ὧν δὲ ἐγγύς τῆς δια-
ρρηκτικῆς φλεβὸς ἔστι τις φλεγμονὴ
μεγάλη, καθάπερ ἐπὶ πλευριτι-
κῶν x) καὶ ἡπατικῶν, κάλλιστον
ἐστὶν ἀναμένειν τὴν μεταβολὴν y)
τῆ αἵματος ἐν τε z) τῇ χροίᾳ καὶ
τῇ συστάσει a). Ἔτερον δὲ b) ἐπὶ
τὸ κατὰ τὴν c) φλεγμονὴν αἷμα
τῶ κατὰ φύσιν, ἐπειδὴ θερμανό-
μενον d) ἐπὶ πλεῖον, εἰ μὲν ἦν ἔμ-
προσθεν ὁμότερον, ἐρυθρότερόν τε
καὶ ξανθότερον γίνεται. εἰ δὲ μὴ
τὸ e) τοιαῦτον εἴη ἔμπροσθεν, ἐπὶ
τὸ μέλαν ἐκτρέπεται καταπτώ-
μενον· εἰ μὴ f) ἐκ παντὸς τρόπου
ἀφαιμένειν g) χρὴ τὴν μεταβολὴν,
ἀλλ' ἔσθ' ὅτε καὶ πρὸ τῆ γενέσεως
παύεσθαι προσήκει h) διὰ διττὴν
αἰτίαν· ἢ τοι δυνάμειος ἀρρώστια i),
(Γνώσεις δὲ ταῦτα k) τῶν σφυγ-
μῶν ἀπτόμενος, εὐρήσεις δὲ αὐ-
τὸς ἀνωμαλίας l) κατὰ σφοδρό-
τητα

et prae ceteris conueniat aetati
atque aegroti naturae, ratione
habita insuper anni temporis,
regionis et morum aegri. In
quibus vero iuxta sectam ve-
nam est quaedam vehemens
inflammatio, vt in pleuriticis
et hepaticis, optimum fuerit
expectare sanguinis mutatio-
nem in colore et concretio-
nem. Alius enim est post in-
flammationem sanguis, ac si na-
turalis est, siquidem dum nimis
calescit, si antea fuerit crudior,
fit rubicundior et magis flauus.
Quod si vero horum nullum
antea fuerit, in nigrum post
congelationem vertitur. Mini-
me igitur semper expectare li-
cet commutationem, sed ali-
quando etiam, antequam ap-
pareat, cessare decet propter
duplicem causam, aut ob vi-
rium

Tom. VI. opp. Sed et GREGORIUS NAZIANZENSIS, Orat. I.
eandem sic laudauit: χῶρας γὰρ καὶ κυρῆς, καὶ ἡλικίας, καὶ ὥρας, καὶ
τὰ τοιαῦτα ὁ ἰατρεὺς ἐπισκίψεται.

x) PAVLL. add. τα.

y) Addidi τὴν μεταβολὴν ex PAVLLO.

z) Def. ap. PAVLL.

a) Haec ap. GAL. c. 14. similiter leguntur.

b) GAL. γὰρ.

c) Ap. GAL. deest.

d) GAL. ἐπὶ θερμῶν.

e) Deest ap. GAL. et PAVLL. μὴ τὸ, et leg. ἦν. PAVLL. ἔην.

f) Quae seq. ap. GAL. sunt. g) GAL. et PAVLL. περιμένειν — ταύτην.

h) Cod. male προσήκει. GAL. leg. προσήκει. PAVLL. διττ. τὴν.

i) GAL. ἀρρώστιας, et immediate κακῆθους φλεγμονῆς. Cetera desunt,
quae vncinis inclusi, non item ap. PAVLLVM. Equidem repos.
κακῆθους pro κακοῦς.

k) PAVLL. γνώση δὲ μάστις λυμίνη ταύτης τῶν — ἐν. γὰρ.

l) Rectius pro vitioso cod. αἰσ. μάστις scrib. sec. PAVLL. ἀνωμαλίας.



τητα καὶ μέγεθος, ἢ καὶ ἀμυ-
δρῆς, καὶ ὁ τόνος τῆς ῥύσεως ἐκλά-
ζων m) ἀτονῆσαν ἤδη τὴν δύνα-
μιν ἐνδείκνυται) ἢ καὶ διὰ φλεγ-
μονῆς κακοήθειαν· ἐνίοτε γὰρ
ἔδεν μεθιήσιν, ἀλλ' ἐσφίγεται n)
σφοδρῶς· εἰ δὲ μηδὲν κωλύει τῶ-
ν, ὃ τε κάμνων ο) ἀκμάζων εἴη,
περιμένειν χρὴ τὴν μεταβολήν,
καὶ μᾶλλον, εἰ τὸ περιέχον ἑυ-
κρατον εἴη· εἰ δὲ τὸ αἷμα πρὸ
τῆς αὐτακρῆς p) κενώσεως ἐπιρρε-
θεῖη, τὸτο δὲ γίνεται ἢ διὰ δειλίαν
τε q) καὶ λειποθυμίαν, ἢ διὰ θρόμ-
βον, ἢ διὰ βιάαν σφίγγειν r), πρὸς
ἕκαστον τῶν ἀρμωσάμεθα, τὴν
μὲν λειποθυμίαν τοῖς σφραγιστοῖς
ἀνακτάμενοι, τὴν δὲ σφίγγειν
ἀνέντες τὸν δεσμόν, τὸν δὲ θρόμ-
βον τῇ τῷ χλιαρῷ ὕδατος s) ἐπι-
χύσει, ἢ ἐλαίῃ t) ψυχρῇ, ἢ τῇ
τῶν δακτύλων ἐπιτάλῃ δια-
λύοντες· ἢ δὲ λειπὴ τῆς φλεβο-
τομίας παρασκευὴ πᾶσι γνώρι-
μος·

rium infirmitatem. (Id quod
pulsus tangendo cognoscēs, et
inuenies illos inaequales in ve-
hementia et magnitudine, aut
quoque exiles, et robur fluo-
ris labascens imbecilliores iam
vires ostendunt), aut propter
inflammationis malam indo-
lem. Interdum enim nihil re-
mittit; sed vehementer con-
stringitur. Sin vero nihil ho-
rum obstat, aegro adhuc vali-
do, exspectanda est commu-
tatio, in primis vero si aer fue-
rit bene temperatus. Si autem
sanguis ante idoneam vacua-
tionem supprimatur, id fit aut
propter timiditatem et animi
defectionem, aut propter gru-
mum, aut propter vehemen-
tem strictionem; quibus singu-
lis subueniamus, odoratu sua-
uibus animi deliquium tollen-
do, compressionem relaxando
vin-

m) Cod. ἐκλάζον. GAL. leg. c. 14. τὸ τοῖον τῆς ῥύς. ἐκλάζοντι. PAVLL. ἐκλάζον — δι.

n) GAL. ἐσφίγεται, PAVLL. ἐσφίγεται. Recte, pro praua lect. cod. ἐσφι-
σίσσεται. Cetera, quoad sensum, ap. GAL. sequuntur, etsi paullo
mutatis verbis.

o) GAL. φλεβοτομούμενος, et paullo post προσέκειναι pro χρὴ. PAVLL. hab. δὴ.

p) Cod. Μοσχ. αὐτάρκην.

q) PAVLL. non hab. τε. at infra post βιάειν addit.

r) Legendum est σφίγγειν pro σφιξειν, quam lect. cod. habebat.

s) Scrips. ὕδατος pro ὕλατος; Frequentissima enim est in vett. codd.
τῶν λ. et δ. confusio.

t) PAVLL. leg. ἢ ἐλαίῃ ἐπιχύσει, ἢ τῇ τῶν δακτ. ἐπιτάλῃ. Cod. Μοσχ.
ἐπιθάψῃ.

μος· καὶ υ) ταῦτα μὲν ἐπὶ τοῖς
κατὰ τὸν ἀγκῶνα· ἡ δὲ ἀπὸ με-
τώπης υ) ἀφαιρέσεις, ὡς ἐπὶ κεφα-
λαλγιάων, γίνεται ω), προαπαν-
τλήσαντες αὐτὰς ἐπιδήσωμεν τε-
νέδιω χ) κατὰ τὸν τραχήλον, πα-
ρεθέσει δακτύλῳ κατὰ τὸν βρόγ-
χον, τὸν πνιγμὸν γ) ἀποφεύ-
γοντες, καὶ πληρωθεῖσαν τὴν
φλέβα τὴν ἐν μετάπῳ διέλωμεν
ἀκμῇ φλεβοτόμῃ ἢ συμπλῆς.
Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ τὰς
ἐπιπολῆς σφαγιτίδας ς) δι'
ὀφθαλμίαν χρονίαν τέμνωμεν
διὰ κυαθίσκου α) μήλης, τὴν
τῷ αἵματος ἔκροισιν ποιεῖμενοι β)
καὶ τὰς ὑπὸ τῇ γλώσσῃ δὲ φλέ-
βας, ὡς ἐπὶ συναγχικῇ πάθῃς,
ἔγκαρσίως ε) ἐκτέμνωμεν φυλατ-
τόμενοι τὴν ὀίγξιν, τινὲς δ) δὲ
καὶ τὰς ἐν τοῖς μεγάλοις κήθοις
διαφανεῖς φλέβας, ὡς ἐπὶ τῶν
ἐν τῇ κεφαλῇ ἢ τῶν ε) ὀφθαλ-
μοῖς

vinculum, grumum vero te-
pidae aquae aut olei frigidi
affusione, aut digitorum fotu
dissoluendo. Reliquus vero ve-
naefectionis apparatus inter o-
mnes constat. Haecenus de illis,
quae ad cubitum attinent. San-
guinis vero detractio a fronte
fit, vt in capitis doloribus, fo-
mento prius superhabito, iis
collum ligemus fascia, digito
ad guttur immisso, vt suffoca-
tionem effugiamus, et plenam
frontis venam infecemus cu-
spide phlebotomi vel scalpelli.
Eadem quoque ratione iugu-
lares venas externas ob diutur-
nam ophthalmiam specillo con-
cauo incidimus, sanguinis ef-
fluuium procurando. Venas ve-
ro subter linguam, vt in angina,
oblique secamus, adstri-
ctionem vitantes. Quidam et
cas

υ) PAVLL. ἀλλὰ κατ' — ἀγκ.

υ) PAVLL. add. ἡ. Cetera ad sensum GAL. c. 19. habet.

ω) PAVLL. γίνεται. χ) PAVLL. τενέδιω. γ) PAVLL. τῷ πνιγμῷ.

ς) In cod. leg. ἐπὶ πολλῇ σφαγιτίδῃ, quod sine sensu est. Scrib. ergo
fine dubio, vt in contextu fecimus, attestante PAVLLO.

α) Scrib. pro corrupto κυαθίσκῳ est κυαθίσκῳ.

β) Quae sequi. CHART. habet, vsque ad διαρῶσιν, etsi sub alio con-
textu.

ε) CHART. ἔγκαρσίως, quam lect. recepi. Cod. Mosqu. hab. ἔγκρισιν sine
sensu. PAVLL. ἔγκαρσίως.

δ) CHART. τινὲς, quod etiam praeualet lect. cod. Mosq. τινὰ. Haec
ex GAL. c. 14. sunt.

ε) GAL. et PAVLL. τοῖς. Equidem leg. τῶν ἐν ὀφθαλμοῖς.



μοῖς χρόνιων νοσημάτων, ὁμοιο-
τρόπως διαίρῃσιν. ἐφ' ὧν καὶ
τὰς ἐνδον τῶν μυκτῆρων ἤτοι διὰ
παραθλίψιν f) διὰ σμῆλης πυ-
ρῆνος g), ἢ καὶ h) διὰ τινῶν τρα-
χειῶν ἐρεθίζοντες ῥηγνύσιν. Καὶ
τὰς ὀπίσθεν δὲ τῶν ὠτων, διὰ
τὰ περὶ τὴν κεφαλὴν πάθη διαί-
ρῃσι. Τὰς δὲ κατὰ τὴν ἰγνὴν i),
ὡς ἐπὶ νεφριτικῶν k), καὶ τὰς
ἐν τοῖς ἄκροις τοῖς τῶν ὑπερκειμέ-
νων δεσμοῖς μορίων, τῆτε τῶν χει-
ρῶν ἀνατρίψει καὶ τῇ τῶν ποδῶν
βάτει l) πληρώσαντες διαίρῃσιν,
ἐν μὲν τῇ εὐανύμῳ χειρὶ, ὡς m)
ἐπὶ σπληνιτικῶν n), τὴν μεταξὺ
μάλιστα μικρὰ τε καὶ παραμέσθ
δακτύλῳ, ἐπὶ δὲ ἡπατικῶν,
τῇ ο) δεξιᾷ. ἢ γὰρ τῶν ἄκρων
κένωσις ἐκ μακρῶ μᾶλλον γινο-
μένη πρακτικώτεραν τὴν ἀντίστα-
σιν ἐργάζεται p). ἐν δὲ τῷ ποδὶ,
καθάπερ ἐπὶ ἰχθυαδικῶν ἢ τῶν q)
κατὰ

eas venas, quae in magnis ocu-
li angulis apparent, similiter
aperiunt, vt in capitis aut ocu-
lorum diuturnis morbis. Quin
etiam illas intra nares aut per
compressionem specillo sub-
iecto, aut per quaedam aspe-
ra irritando dilacerant. Et
quae sunt pone aures sitae,
has propter capitis dolores
diuidunt, illas vero, quae iux-
ta poplitem sunt, in nephre-
ticis, et illas, quae in extremis
subiectarum partium vinculis
sunt, frictione manuum ac pe-
dum gressu plenas factas va-
cuant, in sinistra quidem ma-
nu, vt in spleneticis, mediam
inter paruum et anularem di-
gitum, at vero in hepaticis,
eam, quae in dextra. Extre-
morum enim euacuatio, e lon-
ginquo quasi facta, reuulsio-
nem

f) PAVLL. παραθλίψιν.

g) CELS. τῆς μέλης πυρῆνα ex pl. per *specillum subiectum*.

h) Deest καὶ ap. PAVLL.

i) PAVLL. κατ' ἰγνύν. Mallem leg. ἰγνύν, vel ἰγνύν, quae ap. HESYCH.
τὸ τῆ γόνατος ὀπίσθεν μέρος est, ap. HYPATVM p. 154. τὸ ὑποκάτω τῆ
γόνατος. cf. HIPPOCR. Epid. VI. Sect. I. 5. CHART. l. cit. simili sensu,
et si contextu alio, hab. ταῖς ἐπιγυνύουσ, et paullo inferius, τῆς κατ'
ἰγνύν χειρὶ τρίμην.

k) PAVLL. νεφρῶν.

l) PAVLL. βελίον.

m) Ap. PAVLL. excidit, sed adesse debet.

n) PAVLL. σπληνικῶν.

o) PAVLL. ἐν τῇ.

p) Haec CHART. habet immediate post ὁμοιοτρόπως διαίρῃσιν, quae prae-
ced. pag. indicauit.

q) Ap. CHART. deest τῶν.

κατὰ τὴν ὑσέραν, τὴν ἀνώτερην) τῇ ἑνδοθεν ἀσπραγάλῃ τέμνουσιν).

nem inducit efficaciorē. In pede vero, quemadmodum in ischiadicis aut affectionibus vteri, superiorem interni mal-leoli venam secant.

Ἡ κεφαλὴ ἔχει φλέβας εἰκοσι· δύο εἰς τὰ ὠτα ὀπίθεν, καὶ δύο ἐπάνω, δύο ὀπίθεν εἰς τὸν τράχηλον, δύο ἐπάνω εἰς τὸ μέτωπον, δύο ἐπάνω εἰς τὴν κορυφὴν· καὶ ὅταν θέλεις τέμνειν τὰς τῆς κεφαλῆς, θίξ τὰ τέσσαρα σὺ δακτύλα υ) ὑπὲρ αὐτῶν τῶν ἐντὸς, καὶ τῆς ἄλλης πάλιν χειρὸς ὁμοίως ὑπὲρ αὐτῶν τῶν ἐτέρω ὠτῶν, καὶ μοῖρασον ἐπίσης, καὶ κόψον ἐπάνω εἰς τὴν κορυφὴν ἑν-θεν κατ' ἐναντία τῇ πρῶσῳ πρὸς τῶν ἀρτηριῶν μέχρι τῆς ὁσθ' διὰ κρανολύτης υ)· εἰσὶν εἰς τὰς μή-γγας δύο· καὶ τεμνόμεναι ὠφέ-λουν εἰς πᾶσαν νόσον τῆς ὁσθ'.

Capitis viginti sunt venae, quarum duae pone aures et duae supra, duae retro ad col- lum, duae supra in frontem, duae supra in verticem decur- runt. Et cum volueris capi- tis inscicare venas, superim- pone quatuor digitos tuos su- pernae auris interioris parti, alteramque manum eodem mo- do supernae parti auris alterius, aequaliter diuide, et discinde desuper verticem hinc atque illinc ex opposito faciei arte- riarum usque ad os cranolyto. Sunt intra cerebri membranas venae duae; quae si aperium- tur

r) CHART. ἀνωτέρω. PAVLL. τῇ ἀνωτέρω. Recte. Sed haftenus PAVLLVS.

s) CHART. add. εἰς ὠτίαν. Sed glossam redolet.

t) Quae sequi videtur a feriori medico esse profecta et ipso huius centonis auctore. cf. EBN SINA L. I. Fen. 4. c. 20. p. 147. seq. ed. Basil. 1556.

u) Leg. δακτύλια.

v) Κρανολύτης, quod qualeue instrumentum sit, dubium est. Nuspiam enim memoratur, ne a CANGIO quidem. Videtur tamen fuisse aut cultellus, quo membranae inciderentur, maxime capitis, quia ap. ORIBAS. Anat. p. 7. ed. Dund. leg. τῇ παχείᾳ τὸ περιεχόμενον ἔξω-θῃ ὅσῳ, ὃ δὲ καὶ κρανίον ὀνομάζεται, καὶ θάπτεται κατὰ τὴν ἐπίκνηται, aut etiam instrumentum peraccommodatum ad venaesectionem, quod alte penetrabat, neque vero, ut infra dicitur, nervos laedebat. Forfan idem, quod nostri chirurgi vulgo adhibent, der Schnepper. Iubet vero EBN SINA l. c. p. 149. apparatus plurium phlebotomorum.



τός· καὶ μέσον ιω) τῷ μετώπῳ
 ἔστι μία, καὶ ὠφελῆς εἰς τὴν κε-
 φαλαλγίαν· ὠφελῆς καὶ εἰς φρε-
 νητικὰς, ἐὰν κενώσῃ αἷμα ἐξ αὐ-
 τῆς, ὅσον χωρεῖ λέπος ωβ· χα-
 ριν δὲ τῆς κεφαλαλγίας τεμνομέ-
 νη πλείον ὠφελῆς κενῶσαι, καὶ
 εἰς ληθάργους· εἰσι καὶ εἰς τὸν
 τράχηλον δύο· ἐνθεν καὶ ἐνθεν,
 καὶ λέγονται κ), — καὶ ὠφελῆ-
 σιν, ὅταν ἔχει ἡ κεφαλὴ ὕλην
 ἐξ ἀναθυμιάσεως υ). ὠφελῆσι
 καὶ εἰς τὰς ὀφθαλμούς καὶ εἰς τὰ
 ὄλα ς). εἰς ἕκαστον βραχίονα
 τέμνομεν τέσσαρας, εἰς μὲν τὴν
 δεξιάν χεῖρα κεφαλικὴν, καθο-
 λικὴν α), νεφριτικὴν καὶ ἥπατι-
 κὴν· καὶ ἡ μὲν κεφαλικὴ ἔχει
 τὴν ἀρχὴν ἀπὸ τῆς κεφαλῆς, καὶ
 δεῖ κόπτειν αὐτὴν μετὰ δέξας ἀ-
 κρόπλοα δ), ὅσε μὴ φθάνειν
 κάτω τὸ σιδήρον· ἡ δὲ μέση τὴν
 ἀρχὴν ἔχει ἀπὸ τῶ πνεύμονος,
 καὶ κείται μέση δύο νεύρων· τέμνε-
 ται ἐν ὀρθῶς διὰ φόβον τὸ μὴ
 πλησιάζειν νεῦρον τὸ σιδήρον· εἰ
 δέπως

tur, omnibus in oris morbis
 profunt. Media in fronte vna
 est, quae capitis doloribus me-
 detur, et ipsis phreniticis, si
 tantum exinde sanguinis, quan-
 tum oui putamen capit, emit-
 tas. Ob capitis dolorem secta
 plus iuuat euacuare, item in le-
 thargo. Sunt quoque ad collum
 duae hinc illinc, quae dicuntur
 et profunt, cum caput ex vapo-
 re dolet. Conducunt etiam o-
 culis et gingiuis. In vtroque
 brachio incidimus quatuor,
 dextra quidem manu cephalicam,
 catholicam, renalem at-
 que hepaticam. Cephalica in-
 cipit a capite, et caute inse-
 canda est in superficie, ne fer-
 rum altius penetret. Media
 vero a pulmone oritur, et me-
 dia inter duo nervos sita est.
 Aperitur igitur prouide, ne
 ferrum nervos attingat:
 Quod si fit, nascitur cum do-
 lore vulnus, vnde sanguis spis-
 sus

ω) Leg. εἰς μέσον aut ἐν μέσῳ.

κ) Hic excidisse videtur nomen, quod habebant.

υ) Nobilissima et notissima haec veterum de vaporum ad caput ascen-
 su et noxis doctrina est, de qua v. infra.

ς) In cod. ὅλη.

α) Haec venarum nomina et paullum abhorrentes distinctiones vi-
 dentur deberi medicis Arabibus. Certe non memini, talia me
 ap. Graecos legere, et aliter docet anatome.

δ) In cod. sic scribitur, ἀκρόπλοα. Legendum est sine dubio, ἀκρόπλοα,
 quod EROT. et GALEN. in Gloss. Hipp. expl. per τὰ ἐπιπολάτως οἶον
 ἐπ' ἀκρὸς ἐμπόλιστα, i. e. in superficie. Cf. ROES. Oeconom. sub h. voc.

δέπωσ πλησιάζει νεῦρον, γίνεται
μετὰ οὔνης καὶ πληγῇ ἐκχέουσα
αἷμα παχύ, καὶ ἕλκος, καὶ
τεῦθεν πολλάκις συμβαίνει κιν-
δυνεύειν τὸν ἄνθρωπον· ἡ δὲ νεφρι-
τικὴ ἔστιν ὑποκάτω τῆ ἀγκῶνος
ἐκατέρας χειρός· κόπτει ἂν αὐτὴν
ὀρθά. εἰς δὲ τὴν ἀριστεράν χειρὰ
ἔχει τὰς ἀρχὰς ἀπὸ τῆ σπληνός,
καὶ δεῖ κόπτειν αὐτὴν κατὰ τὸ σῶμα
καὶ ὑπὸ πλαγίῃ c), διὰ τὸ κεί-
σθαι αὐτὴν ἐπάνω τῶν μορίων.
καὶ ἡ μὲν κρανιακὴ d) κοπτομένη
ὠφελῇ κεφαλαλγίας, ἐπιλη-
πτικῆς καὶ τὰς ἔχοντας βάρους εἰς
τὸ σῆθος.

fus dimanat, ac vlcus, postea-
que saepius homo in vitae di-
scrimine versatur. Renalis est
infra vtriusque manus cubi-
tum, quam directe secare li-
cet; in sinistra vero manu ha-
bet a splene initium, et ape-
rienda ad os et ex obliquo est,
quippe quae supra membra
posita est. Et craniaca vena
secta prodest dolentibus ex ca-
pite, epilepticis et habentibus
circa praecordia anxietatem.

c) In cod. ὑπὸ πλά, scriptum est, forte leg. ὑπὸ πλαγίῃ.

d) Craniaca vena i. e. quae os capitis intrat, et, vt ex anteced.
patet, non diuersa a cephalica est.

Quae restant, proxime. Laudandus enim et commen-
dandus prae ceteris est optimus iuuenis,

FREDERICVS HOFFMANN

ALTEBVRGENSIS

qui, dum apud nos erat, ita vixit, vt optimo cuique se
probaret, ita literas et medicinam tractauit, vt spem cer-
tissimam faceret, fore eum aliquando medicum et sibi, et
patriae vtilissimum. Cuius ingenium et discendi cupiditas
mihi, si cui alii, cognita et probata effecerunt, vt mihi prae cete-
ris carus esset, ideoque sine vllis verborum ambagibus vitae
rationem ipsis candidati optimi verbis huc adscribere placet.



Ego, FREDERICVS HOFFMANN, *Alteburgi, a. d. XXVI. April.*
 cło 1000 LVIII. auras vitales coepi haurire. Patrem veneror,
 IOANNEM GVILIELMVM, Senatus sacri, qui est illinc loci, con-
 siliarium, matrem CHRISTIANAM SOPHIAM, e gente RICH-
 TERIA. Optimi hi, carissimi ac aeternum coleudi parentes ex-
 quisitam in me educando, inprimisque ad pietatem praeceptis
 exemplisque conformando collocarunt curam, quam indefessa qui-
 dem et assidua gratiarum actione nunquam rependere valeam.
 Curae vero, quam requirebat educatio, haud minimam partem
 in se suscepit aestumatissimus aequae ac carissimus, qui mihi con-
 tigit, auunculus, P. E. RICHTER, Duci Serenissimo a consiliis
 imporeticis, illi quantum debeam, gratissimi animi tacito sensu
 malo, quam verbis haud suffecturis prosequi. Pueri erudien-
 di provincia praeceptoribus domesticis demandata est, hincque
 gratam memoriam MATHESII et AVENARII recolo. Domestica
 vel priuata, ut aiunt, horum praeceptorum aliquamdiu vsus
 institutione, Gymnasii, quod Alteburgi floret, ciuibus me ad-
 scripsit, Cl. MOERLINVS, tunc Gymnasii director, nunc vero
 beatorum coetui insertus. Linguis et Latinae, et graecae, illinc
 dedi operam sub auspiciis doctissimi, et meritissimi Professoris,
 LAVRENTII, cuius in me fauorem et amicitiam nunquam satis
 laudare potero. Quos cepi in mathesi utraque fructus, eos ami-
 cae et solidae institutioni doctissimi Professoris, DOEHLERI, de-
 beo. Excolendis altioribus studiis par factus, anno huius seculi
 LXXV. me legam contuli, ut in hac academia longe celeberrima
 artem medicam, et quae ad eam referuntur, scientias cognitatas et
 perspectas mihi redderem, et a Summe Reuerend. et Magnifico Viro,
 DANOVIO, tunc Acad. Prorectore, in numerum studiosorum
 relatus sum. Hic coepi logicae, metaphysice, et omnibus philo-
 sophiae partibus operam nauare, inque his ducem et magistrum
 secutus sum Excell. VLRICH, eiusque erga me beneuolentiae do-
 cumenta mente gratissima agnosco. Cunctas matheoseos partes,
 neque non asronomiam, algebram et cosmologiam Ill. ex
 WIEDEBURG didici, physicam et chemiam rationalem docuit
 me Illustris atque Excellent. SVCCOW, WALCHII, nunc re-
 bus

bus humanis erepti praelectiones, quibus historiam naturalem explicaret, audiui. Quibus disciplinis probe praeparatus medicorum scholas adii, et in medicina legali audiui Illustrum NICOLAI, Ordinis gratiosi senioremaxime venerandum, caeterum vero in medica addiscenda arte totum me tradidi disciplinae Viri Illustris atque Excellentissimi GRVNERI, Duci Saxo-Vimar. a consiliis aulicis, praeceptoris aeternum pietate omni ac venerationis cultu prosequendi, professoris propter eruditionis amplitudinem et medicinam explanate docendi facultatem famamque celebrari, cuius in me merita tot tantaque sunt, ut verbis non valeam exprimere. Ille enim non modo methodum studii medici, physiologiam, pathologiam, semioticam, materiam medicam, therapeiam, tam generalem, quam specialem, artem formulas medicas concinnandi, omni cum sollertia me docuit, sed quoque veteres medicos Latii Graeciaeque notos interpretando eorum codices mihi reddidit, nec non sub Illius auspicio in arte de rebus medicis disceptandi me exercui. Anatomem ex praelectionibus demonstrationibusque tum beati NEUBAVERI, tum Ill. LODERI, Fautoris plurimum colendi, discere mihi contigit. Artem obstetriciam mihi tradiderunt NEUBAVER; Illustr. LODER et Excellent. STARCKE. In ophthalmologia, re herbaria atque chemia experimentalis perutilis mihi fuit Experient. SCHENK. Deinde in addiscendis linguis exoticis usus sum praeceptoribus Nob. DE VALENTI, Clar. SALZWEDEL, et Clar. NICHOLSON. Tribus denique annis in nobilissimo musarum domicilio peractis, Berolinum adii, studia medica prosecuturus. Illinc doctissimi et Illustris Viri, WALTERI, praelectiones physiologicas, anatomicas, easque in artem obstetriciam frequentius, nec non sub eius auspicio per sex menses corpora demortuorum in theatro regio dissectui. Adeo secretioribus anatomicis eiusdem laboribus indultuperquam liberali interesse mihi licuit. Viri immortaliter de orbe medico meriti paternum erga me fauorem, et animum propensionem grata memoria pectus repetere et nuncupare iubet. Ibi quoque arctius animum conuertere ad eam medicinae partem, quae manu opem fert laborantibus, quam ob causam ex ore Celebrissimi HENCKEL, nunc fato persuncti, qui tunc operationum chirurgica-



rum seriem traderet, hausi, nec non morbos externos eum dexterrime tractantem, in valetudinario, la Charite dicto, pluries vidi. Praeterea fasciarum habenarumque pangendarum artificium ille vir me docuit, et commoda ex praelectionibus, quas de fracturis et lacerationibus haberet, me cepisse confessor. Denique ad Experientissimum ACHART me applicavi, eique frequens adfui, Chemiam praecipiendo demonstrandoque experimentis tradenti. Denique patriam repetii, atque ad capeffendos summos medicinae honores memet accinxi. Scripsi etiam nuper libellum de gonorrhoeae indole vere venerea.

Nuperrime ex patria huc concessit, doctoris gradum consecuturus, et collegio nostro abunde se probavit. Quare ei data venia est, in publicum prodeundi, ac, defensa *disputatione sine Praeside*, praemia vitae academicae praeclare peractae reportandi. Dictus huic sollemni panegyri est dies xviii. Augusti. Cui ut frequentes interesse velint MAGNIFICVS ACADEMIAE PRORECTOR, COMITES ILLVSTRISSIMI, PATRES CONSCRIPTI, ceterique PROFESSORES CLARISSIMI, MVSA-RVM FAVTORES, et COMMILITONES GENEROSISSIMI ac PRAENOBILISSIMI, id est, quod ordinis mei verbis etiam atque etiam rogo. P. P. Sub Sigillo Facultatis a. d. xii. Aug.

clō b cc lxxx.

